

MONILÍASE DO CACAUEIRO



Uma nova praga agrícola já está no Brasil - no Acre e no Amazonas - e pode atingir o Espírito Santo. Um fungo que ataca as plantações de cacau e cupuaçu causando a Monilíase do Cacaueiro.

Vamos saber mais sobre essa doença, aprender a prevenir e mantê-la bem longe daqui?



1. O QUE É?

Fungo que atinge o cacau e o cupuaçu

2. AFETA O SER HUMANO?

Não, mas pode causar perdas de até 100% da produção.

3. QUANDO OCORRE?

Em todas as fases de desenvolvimento do fruto, mas principalmente no início.



4. QUAIS SINTOMAS?

Inicialmente, inchaços e manchas amarelas ou verdes. Após 45 a 90 dias, aparecem manchas necróticas (marrom-escuro).

5. E O SINTOMA PRINCIPAL?

Um pó branco (esporos), que se forma depois de 5 a 12 dias, toma conta do cacau e do cupuaçu e se solta e facilmente.

6. COMO SE ESPALHA?

Os esporos são levados com o vento, chuva, insetos, animais e pelo homem, por meio de roupas, calçados, transporte de frutos e outros objetos contaminados.

7. COMO PREVENIR?

Não transporte frutos, sementes, mudas e hastes de cacau ou cupuaçu. Só adquira materiais com nota fiscal e em viveiros registrados pelo MAPA.



8. E SE ACHAR ALGO SUSPEITO?

Não retire frutos, sementes ou hastes da planta afetada ou suspeita.

Isole a área e avise imediatamente aos órgãos competentes.

